

Diclogesic®

Diclofenac
dietilamina al 1%
50 g de gel

gel

Gel de uso tópico

VENTA LIBRE - INDUSTRIA ARGENTINA.

- *Lea con cuidado esta información antes del uso de este medicamento.*
- *Conserve esta información, ya que puede tener que leerla nuevamente.*
- *Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aparece cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, consulte a su médico y/o farmacéutico inmediatamente.*

¿QUÉ CONTIENE DICLOGESIC® GEL?

Cada 100 gramos de gel contiene: **Ingrediente activo:** 1 gramo de Diclofenac Dietilamina.

Ingredientes inactivos: Carbopol; Imidurea; Trietanolamina; Alcohol y Agua destilada.

ACCIONES.

DICLOGESIC® GEL actúa contra la inflamación y calma el dolor. Es de USO EXTERNO.

¿PARA QUÉ SE USA DICLOGESIC® GEL?

DICLOGESIC® Gel se usa para el alivio local del dolor y de la inflamación leves y ocasionales producidos por: afecciones reumáticas, articulares (lumbalgia, torticolis), golpes, distensiones musculares y/o tendinosas, torceduras.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN USAR DICLOGESIC® GEL?

- Si Ud. sabe que es alérgico al diclofenac, ácido acetilsalicílico, otros antiinflamatorios no esteroideos, u otros componentes.
- Si Ud. tiene crisis asmáticas, urticaria o rinitis desencadenadas por aspirina u otros antiinflamatorios no esteroideos.
- No utilizar este medicamento en niños y adolescentes menores de 12 años.

¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER ANTES DE USAR DICLOGESI® GEL?

DICLOGESI® GEL debe ser aplicado sobre la piel sana y nunca sobre piel con heridas. No se debe cubrir la zona de la aplicación. DICLOGESIC® GEL no debe entrar en contacto con los ojos o mucosas y no debe ingerirse por vía oral. Si el gel es aplicado en áreas del cuerpo que son extensas, la absorción puede ser mayor y por lo tanto el riesgo de efectos no deseados puede



aumentar, especialmente si el tratamiento es realizado frecuentemente.

Si Ud. recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebe, consulte a su médico antes de utilizar este producto.

¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER MIENTRAS ESTÁ USANDO DICLOGESIC® GEL?

Evite exponerse al sol ya que puede causar fotosensibilidad, esto es hipersensibilidad a la luz.

No utilizar vendajes oclusivos. Ocasionalmente pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como picazón, enrojecimiento, inflamación, ampollas, casos aislados de erupción cutánea generalizada, reacciones de hipersensibilidad (por ejemplo: ataques asmáticos, inflamación de la piel y mucosas), reacciones de hipersensibilidad a la luz. Suspnda su uso y consulte a su médico ante la aparición de cualquier síntoma que le impresione relacionado con el uso del producto, que le ocasione preocupación o le parezca poco usual. No aplicar este producto por más de 7 días seguidos. Si los síntomas persisten o empeoran por más de 48 o 72 horas, consulte con su médico.

¿CÓMO SE USA DICLOGESIC® GEL?

Adultos y mayores de 12 años: DICLOGESI® GEL debe ser aplicado en una capa delgada 3 a 4 veces por día. Aplicar masajeando sobre la piel en forma circular. Luego de la aplicación, se deben enjuagar las manos a menos que éste sea el sitio a tratar. DICLOGESIC® GEL es de uso externo.

“Si los síntomas de dolor persisten por más de 3 días consulte a su médico”

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI USÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN CONCURRIR AL HOSPITAL MAS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: 0800 444 8694 / (011) 4962-6666 / 2247

Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777

Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández: (011) 4808-2655 / 4801-7767

Optativamente otros centros de intoxicaciones.

¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA?

Comuníquese a los siguientes teléfonos: ANMAT Responde: 0800 333 1234

PRESENTACIONES.

Envases conteniendo 1 pomo de 50 g de gel de uso tópico.

MODO DE CONSERVACIÓN: SE ACONSEJA CONSERVAR EN SU ENVASE ORIGINAL, A TEMPERATURA AMBIENTE (PREFERENTEMENTE ENTRE 15 °C Y 30 °C), NO UTILIZAR DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO INDICADA EN EL ENVASE.

MANTENER ÉSTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 24.517.

Elaborado en Guevara 1357, (1427) C.A.B.A., Argentina.

Directora Técnica: Telma M. Fiandrino, Farmacéutica.

TRB PHARMA S.A. Plaza 939, (1427) Ciudad Autónoma de Bs. As.



JULIO 2014

3909-03