

**Tratamiento de la  
Candidiasis Vaginal**

**SÓLO 1 TOMA**



**Fungototal<sup>®</sup> Gyno**

**FLUCONAZOL 150 MG**

***Alivia Ardor, Picazón, Irritación y Dolor***

**VENTA LIBRE**

1 comprimido recubierto  
Antimicótico Vía oral • INDUSTRIA ARGENTINA





# Fungototal® Gyno

FLUCONAZOL 150 MG



LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO. Conserve este prospecto tiene información que puede ser útil volver a leer.

**¿Qué contiene FUNGOTOTAL®GYNO?** Cada comprimido recubierto tiene: Principio Activo: Fluconazol 150 mg. Excipientes: celulosa microcristalina PH 200, dióxido de silicio coloidal, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, Lay AQ P50204P.

**Acción:** Antimicótico de uso por vía oral. FUNGOTOTAL®GYNO se utiliza para el tratamiento de algunos hongos que afectan la vagina (candidiasis vaginal).

**¿Para qué se usa FUNGOTOTAL®GYNO?** FUNGOTOTAL®GYNO contiene un principio activo denominado Fluconazol que pertenece a un grupo de medicamentos denominados azoles. Es un medicamento que combate las infecciones por hongos. FUNGOTOTAL®GYNO es un tratamiento completo para la candidiasis de la vagina cuando la persona ha sido diagnosticada previamente con esta condición por un médico y reconoce los síntomas.

**¿Qué es la candidiasis vaginal?** La candidiasis vaginal es una infección común que la mayoría de las mujeres sufren en algún momento de sus vidas y no es causada por falta de higiene personal. La causa de la candidiasis vaginal es un hongo (una levadura) llamada *Cándida albicans*. Este hongo suele vivir en varias partes del cuerpo, incluida la vagina, sin generar ningún síntoma ya que se encuentra en equilibrio natural con otros microorganismos habituales. Puede que este equilibrio natural se altere, modificando el medio ambiente y por ello la cantidad de *Cándida* puede aumentar hasta convertirse en una infección causando los siguientes síntomas: ardor, picazón vulvar y vaginal, enrojecimiento del área genital, hinchazón y dolor en los tejidos de la vulva y la vagina junto con una secreción (flujo) blanquecina que sale de la vagina y puede manchar la ropa interior. Estos síntomas pueden estar todos juntos o solo alguno de ellos.

**¿Qué factores alteran el equilibrio natural de la vagina?**

- Cambios hormonales (menstruación, uso de anticonceptivos orales, embarazo, menopausia).
- Enfermedades sistémicas agudas.
- Uso de antibióticos.
- Uso de jabones perfumados, productos de higiene íntima y ropa ajustada.

**¿Cómo evitar futuras recurrencias?**

- Utilizar ropa suelta.
- Preferir la ropa interior de algodón.

- Evitar el uso de prendas de material sintético y muy ajustadas.
- Evitar el lavado genital con esponja o con materiales abrasivos.
- Cambiar periódicamente las toallas higiénicas íntimas.

### **¿Qué personas no pueden utilizar FUNGOTOTAL®GYNO?**

NO USE este medicamento:

- Si es alérgica a cualquiera de sus componentes.
- Si está embarazada o dándole el pecho a su bebé.
- Si está tomando medicamentos para el malestar estomacal, como cisapride o medicamentos para el dolor de cabeza, tipo antimigrañoso como ergotamina.

Si tiene algunos de los siguientes síntomas no utilice FUNGOTOTAL®GYNO ya que probablemente este medicamento no sea el más adecuado:

- Sangrado por la vagina irregular o anormal (fuera del período menstrual).
- Úlcera o ampollas en la vulva y/ o vagina.
- Dolor abdominal bajo.
- Dolor y dificultad para orinar.
- Fiebre o escalofríos.
- Mal estado general.
- Vómitos y diarrea.
- Flujo maloliente en la vulva o vagina.

**¿Qué cuidados debo tener antes de tomar FUNGOTOTAL®GYNO?** Antes de tomar FUNGOTOTAL®GYNO, consulte a su médico si:

- No está segura si tiene candidiasis vaginal
- Es la primera vez que tiene síntomas en la vulva y vagina
- Ha tenido más de dos infecciones candidiásicas en los últimos 6 meses
- Ud. o su pareja han tenido enfermedades de transmisión sexual
- Tiene menos de 16 años o más de 60 años
- Ha tenido alguna enfermedad que afecte el hígado o los riñones
- Tiene problemas cardíacos incluido alteraciones del ritmo cardíaco (arritmias)
- Sufre de alguna enfermedad crónica.

**Interacciones medicamentosas:** Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado de forma reciente otros medicamentos incluyendo los que se venden sin receta. No utilice FUNGOTOTAL®GYNO y consulte con su médico si está tomando los siguientes medicamentos:

- Cisapride, un medicamento para tratar desórdenes digestivos como la dispepsia.
- Ergotamina, utilizada frecuentemente para aliviar el dolor de cabeza en las personas que tienen migrañas.
- Anticoagulantes, medicamentos para prevenir la formación de coágulos en sangre.
- Sulfonilureas, se utilizan en algunas personas para el tratamiento de la diabetes tipo 2.
- Hidroclorotiazida, diurético, comúnmente utilizado para el tratamiento de la hipertensión arterial y la retención de líquidos.
- Benzodiazepinas, medicamentos utilizados como tranquilizantes o para conciliar el

sueño.

- Antiepilépticos como la fenitoína, carbamazepina o fenobarbital
- Antibióticos como rifampicina y rifabutina.
- Inmunosupresores, que son medicamentos para reducir la inmunidad como ciclosporina, sirolimus o tacrolimus.
- Teofilina, utilizada anteriormente para controlar el asma.
- Zidovudina, usada para tratar la infección con VIH.
- Losartán, medicamento antihipertensivo utilizado para reducir la presión arterial.
- Fentanilo o metadona, para tratar el dolor.

**Embarazo y lactancia:** No utilice FUNGOTOTAL®GYNO si está embarazada, planea estarlo o se encuentra dando el pecho a su bebé.

**Uso en pediatría:** La seguridad y eficacia en los niños no ha sido establecida.

**Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar máquinas:** Este medicamento puede causar mareos. Si luego de tomar un comprimido ha presentado mareos, no debe conducir ni utilizar máquinas.

**¿Cómo se usa FUNGOTOTAL®GYNO?** FUNGOTOTAL®GYNO es de administración oral. El comprimido debe tomarse con un vaso de agua y se puede ingerir con o sin comida. No es un medicamento de uso intravaginal. El curso de tratamiento completo consiste en ingerir por la boca, un solo comprimido de FUNGOTOTAL®GYNO por única vez. Los síntomas de la candidiasis suelen desaparecer dentro de los dos días de la toma de FUNGOTOTAL®GYNO. En caso de no haber mejora luego de 7 días, se debe realizar una consulta con el médico. Si los síntomas de candidiasis vaginal regresan luego de pasado 7 días se puede tomar otro comprimido de FUNGOTOTAL®GYNO. En el caso de presentar más de dos episodios de candidiasis en el período de 6 meses se debe consultar con el médico.

**¿Qué cuidados debo tener mientras estoy tomando FUNGOTOTAL®GYNO?**

Como todos los medicamentos, este medicamento puede tener efectos adversos, aunque no todas las personas lo sufran. Algunas personas pueden presentar reacciones alérgicas. En ese caso las reacciones ocurren poco después de haber tomado el medicamento. Las manifestaciones de las reacciones alérgicas incluyen:

- Erupción.
- Problemas para tragar o respirar.
- Hinchazón de los labios, cara, garganta o lengua.
- Debilidad, mareo, desmayo.
- Náuseas.

Los siguientes efectos secundarios también han sido reportados: malestar estomacal, cambio en el sentido del gusto, diarrea, dolores de cabeza, trastornos de hígado, coloración amarilla de la piel, con orina oscura y materia fecal clara (ictericia), cambio en el ritmo cardíaco, niveles elevados de colesterol en sangre, reducción en el número de células sanguíneas y plaquetas, bajos niveles de potasio, ampollas en la piel, boca,

ojos o genitales, erupción, picazón, pérdida del cabello, convulsiones, infecciones recurrentes (por ejemplo, resfriado, gripe). Si experimenta alguno de los efectos anteriores o presenta otros que no están incluidos en este prospecto, informe a su médico o farmacéutico.

**¿Qué debo hacer ante una sobredosis o si tome más de la cantidad necesaria de FUNGOTOTAL®GYNO?** Ante una sobredosis accidental vaya al lugar más cercano de asistencia médica o llame por teléfono al centro de intoxicaciones: Hospital de Pediatría Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel: (011) 4962-6666/ 2247 Hospital Dr. Alejandro Posadas. Tel.: (011) 4654-6648/ 4658-7777 Centro Nacional de Intoxicaciones. Tel.: 0800-333-0160.

**Conservación de FUNGOTOTAL®GYNO** Conservar a temperatura ambiente entre 15 ° C y 30 ° C. No utilizar después de la fecha de vencimiento.

**Mantener este y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños. Ante cualquier duda consulte a su médico o farmacéutico.** No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento que aparece en el estuche. La fecha de vencimiento es el último día del mes que se indica.

**Presentación FUNGOTOTAL®GYNO** Envase conteniendo 1 comprimido recubierto. **Ante cualquier inconveniente con el producto**, el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT: <http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/notificar.asp> o llamar a ANMAT Responde 0800-333-1234.

Elaborado en Plaza 939, (1427) C.A.B.A., Argentina.  
Directora Técnica: Telma Marcela Fiandrino, Farmacéutica.  
TRB PHARMA S.A. Plaza 939 (1427) C.A.B.A., Argentina.  
Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud  
Certificado N° 49.207.



SEPTIEMBRE 2024