

# Liberol® Flash

## Loratadina 10 mg

Comprimidos de disolución bucal rápida

VENTA LIBRE - INDUSTRIA ARGENTINA.

- **Lea con cuidado esta información antes de tomar el medicamento.**
- **Conserve este prospecto, contiene información que puede serle útil volver a leer.**

### ¿QUÉ CONTIENE LIBEROL® FLASH?

Cada comprimido de disolución bucal rápida de LIBEROL® FLASH contiene:

Principio activo: loratadina 10 mg.

Principios inactivos: saborizante naranja, saborizante vainilla, dióxido de silicio coloidal, crospovidona (poliplasdone XL 10), aspartame, no bitter 766, amarillo oca laca alumínica, estearil fumarato de sodio, manitol, croscarmelosa sódica.



### ACCIÓN

Antialérgico (Antihistamínico).

### ¿PARA QUÉ SE UTILIZA LIBEROL® FLASH?

Se utiliza para el alivio temporario de los síntomas causados por alergias respiratorias, como ser: secreción nasal, estornudos, lagrimeo, picazón en los ojos, nariz y/o garganta.

También se utiliza para alergias de la piel que se manifiesten con picazón, ronchas y enrojecimiento de la misma.

### ¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR LIBEROL® FLASH?

No tome LIBEROL® FLASH si usted:

- Tiene alergia conocida a alguno de los componentes de la fórmula.
- Niños menores de 12 años de edad.
- Tiene enfermedad hepática y/o renal.
- Es asmático.

### ¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR LIBEROL® FLASH?

- Si tiene intolerancia hereditaria a ciertos azúcares.
- Si tiene más de 65 años.
- Menores de 12 años.
- Si recibe algún otro medicamento.
- Suspender el tratamiento 48 horas antes de efectuar cualquier tipo de prueba cutánea de alergia, ya que los antialérgicos pueden interferir eventualmente dando resultados "falsos negativos".



**Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.**

### **¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?**

Puede producir cansancio, sedación, sueño, dolor de cabeza, mareos, náuseas, palpitaciones.

En pacientes pediátricos puede producir nerviosismo o irritabilidad.

Si usted toma al mismo tiempo algún medicamento sedante o alcohol, puede incrementarse el riesgo de que produzca sueño y que disminuya el estado de alerta.

Evite el uso de cualquiera de los anteriores, junto a este medicamento.

Conducción y uso de máquinas: la medicación puede producir disminución de la capacidad de reacción o sueño a las dosis recomendadas. Si esto ocurre, absténgase de conducir y manejar maquinaria peligrosa.

Si los síntomas alérgicos persisten por más de 5 días, empeoran o aparecen síntomas diferentes a los iniciales, consulte a su médico.

### **¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?**

#### **Administración oral**

**Adultos y mayores de 12 años:** 1 comprimido (10 mg de loratadina) por día.

Colocar el comprimido en la boca, se disolverá rápidamente. Puede ser tomado con o sin agua.

No exceda la dosis diaria. No suministrar más de 1 comprimido cada 24 horas.

La duración del tratamiento no debe superar los 5 días ininterrumpidos.

### **¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?**

Ante una sobredosis accidental vaya al lugar más cercano de asistencia médica (concurra al médico) o llame por teléfono a un Centro de Intoxicaciones:

Hospital de Pediatría Dr. R. Gutiérrez: (011) 4962-6666 / (011) 4962-2247

Hospital Dr. A. Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777

Hospital de Niños Pedro Elizalde: (011) 4300-2115

Centro Nacional de Intoxicaciones: 080-3330-160.

### **MANTENER ESTE Y TODOS LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.**

#### **FORMA DE CONSERVACIÓN:**

Conservar a temperatura ambiente (menor de 30°C) en su envase original.

Evite el calor y la humedad excesivos.

Proteja al producto de la luz solar directa y del calor excesivo.

No refrigere este producto (no ponga este producto en heladera).

Verifique la fecha de vencimiento antes de tomar este o cualquier medicamento.

#### **PRESENTACIÓN**

Envases conteniendo 10 comprimidos de disolución bucal rápida.

---

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.

Certificado N° 56.970.

Elaborado en Plaza 939, (1427) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Directora Técnica: Telma M. Fiandrino, Farmacéutica.

TRB PHARMA S.A. Plaza 939, (1427) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.



**SEPTIEMBRE 2017**

**4205-02**